

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 1-10-81858660 Jo

**PUBLICATION PÉRIODIQUE**  
**BULLETIN TECHNIQUE des STATIONS d'AVERTISSEMENTS AGRICOLES**

**ÉDITION DE LA STATION RHONE-ALPES**  
(AIN, ARDÈCHE, DROME, ISÈRE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE)  
**SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX**

**ABONNEMENT ANNUEL: 70 F**

Exemplaire gratuit

55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3  
Tél. (7) 862.20.30 (Postes 426 et 427)

C.C.P. LYON 9431-17  
Régisseur Avances et Recettes D. D. A.  
55, rue Mazenod - 69426 LYON CEDEX 3

29 Septembre 1981

NUMERO SPECIAL

Bulletin n° 26

## *Lutte contre le Dépérissement Bactérien du Pêcher*

### Deuxième avis de traitement:

- 10 à 12 jours après votre première application vous devez réaliser un deuxième traitement, soit dès le 5 Octobre.
- Au-delà de ce délai l'action du cuivre n'est plus suffisante pour empêcher une remontée rapide des populations bactériennes, d'où des risques importants de contamination au niveau des plaies pétiolaires et des bourgeons.
- La dose de cuivre à employer est toujours de 125 g de cuivre/hl, soit :  
625 g d'une spécialité de Bouillie bordelaise à 20 %  
ou 250 g d'une spécialité d'Oxychlorure à 50 %.

Inutile de l'augmenter.

Prendre les mêmes précautions d'emploi : feuillage sec et beau temps.

**N' OUBLIEZ PAS QU'UNE SEULE CONTAMINATION SUFFIT POUR TUER UN ARBRE.**

L'INGENIEUR EN CHEF D'AGRONOMIE, Chef de la Circonscription Rhône-Alpes : R. GIREAU.  
Poste détaché de VALENCE.

# Variétés : ne plantez plus celles que la bactérie préfère...

## SENSIBILITE DES VARIETES AU DEPERISSEMENT BACTERIEN DU PECHER

(Mise à jour Aout 81)

INRA. Phytobactériologie ANGERS.

PROTECTION des VEGETAUX. Circonscription RHONE ALPES. Poste de VALENCE.

sensibilités Catégorie-variétés	TRES SENSIBLES	SENSIBLES	PEU SENSIBLES **
PECHES  CHAIR JAUNE	Blake Candor * Cardinal Early O'Henry Fairhaven Fayette Hale Haven JH. Hale Lisbeth O'Henry Royal April * Springcrest Suncrest	Collins Early Elbertha Early Hale Early Red Garnet Beauty Hemery July Lady Loring Merrill Franciscan Merrill Gemfree Merrill 49 Merrill Sundance Norman Pekin Redtop Royal Gold Royal Mai Southland Springgold Troy	Ambergold Babiole * Biscoe Clio Dixired Earlyglo Early Redhaven Esgin Redfree Redhaven Redskin Rubidoux Sunhaven Velvet Whynot
PECHES  CHAIR BLANCHE	Arnaud 3 Guilloux Elegante Impero Madame Girerd Redwing Reine des Vergers	Genadix 4 Genadix 5 Genadix 6 Genadix 7 Henri Moulin * Springtime	Amsden Michelini Ribet Robin Sunking
NECTARINES CHAIR BLANCHE	Esja Morton	Fuzalode Silverlode	Nectarose Nectaheart
NECTARINES  CHAIR JAUNE	Andat * Early Sungrand Fuzador Nectared 8 Niagara Stark Red Gold Summergrand	Crimson Gold Esgold Esmet Fuzzless Berta Mayfair Nectared 2 Nectared 9 Redjune Stark Sunglo	Armking Fantasia Independence Mayred Moongrand Nectared 4 Nectared 6 Zeegold
PAVIES	Andross Babygold 6 Babygold 9 Dixon Everts Fortuna Klamt Loadel Shasta Vivian	Babygold 5 Babygold 7 Babygold 8 Baladin Catherina Sudanel Suncling Vésuvio	

\* la sensibilité doit être confirmée par une nouvelle année d'expérimentation.

\*\*les variétés classées "peu sensibles" tolèrent la maladie dans la mesure où la pression d'inoculum est moyenne ou faible ; dans le cas contraire on constate alors une mortalité non négligeable. Cela signifie donc que la plantation d'une variété de ce groupe n'exclut absolument pas la nécessité de mettre en oeuvre toutes les autres mesures d'ordre prophylactique, cultural ou chimique propres à lutter contre le Déperissement bactérien.

***et maintenant faites un BON CHOIX !***